



www.soyar.com.ar
ventas@soyar.com.ar
+54 9 3471 683179
+54 9 3364 360483

Montes de Oca,
Santa Fe

COADYUVANTE ÓRGANO SILICONADO 'SOYMAX 6'

ANTIEVAPORANTE, PENETRANTE, MOJANTE, ANTIDERIVA,
ANTIESPUMANTE, POLARIZADO ECOLÓGICO



El Coadyuvante Órgano-siliconado es un emulsionante que aumenta el número de impactos y el tiempo de contacto con el objetivo. Otorga mayor penetración, absorción y traslocación de los fitosanitarios.

APLICACIONES

Especialmente recomendado para Pulverización Aérea y Terrestre.

Mantiene el ancho de la franja aún en condiciones adversas. Aumenta el número de impactos, la adherencia y absorción aún en baja humedad y altas temperaturas. Disminuye el CV y la tensión superficial de las gotas, las protege con una película antievaporante hidrófuga. Esta característica permite que el producto no se lave con la lluvia (Hidrorepelente).

Es recomendable con todos los productos emulsionables (Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas, Fertilizantes, Foliares).

Recomendamos realizar pruebas de compatibilidad física y biológica de los componentes de fitotoxicidad para el cultivo según el plaguicida a utilizar, especialmente con suspensiones concentradas, micro encapsulados, polvos solubles o granulados.

CARACTERÍSTICAS

DETERMINACIONES	CARACTERÍSTICAS
Aspecto	Líquido
Color	Ambar
Olor	Característico
PH del producto puro	6,8 / 7,2
Densidad del producto puro	0,88 / 0,90
Estabilidad de la emulsión	Cipac A (30 min) : 0,05 ml Cipac C (30 min) : 0,5 ml

PRECAUCIONES: El contacto prolongado del producto puede irritar la piel, usar guantes. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua.



PRESENTACIÓN

BIDÓN 5 LITROS
BIDÓN 20 LITROS
TAMBOR 205 LITROS
CONTENEDOR 1000 LITROS

DOSIS

- Terrestre: 80 cc. a 110 cc. cada 100lts de caldo
- Drone: 100cc en 100lts de caldo
- Aéreo: 50cc a 200 cc en 100lts de caldo.

FORMA DE USO

Se debe agregar al caldo de aplicación DESPUES del FITOSANITARIO. Agregar corrector de PH para evitar la hidrólisis de los plaguicidas, según el PH del agua a utilizar.

Calibrar el tamaño de las gotas menor a 100 micrones especialmente en mezclas con fungicidas del grupo triazoles. No aplicar en caso de inversión térmica o con riesgo de deriva si se utilizan herbicidas no selectivos.